

Amoxicilline comprimé dispersible 250mg



Traitement de pneumonie des enfants de 2 mois à 5 ans

POSOLOGIE

- Démontrer en donnant la première dose. La mère ou l'accompagnant de l'enfant regardera et apprendra.
- Donner ce qui reste de traitement à mère /l'accompagnant pour administrer à la maison.
- **Informez la mère / l'accompagnant qu'il faut donner le médicament 2 fois par jour pendant 5 jours, même si l'enfant se sent mieux.**


		Jour 1		Jour 2		Jour 3		Jour 4		Jour 5		
2 mois à 12 mois												
12 mois à 5 ans												

Compléter tous les jours du traitement

La charge bactérienne diminue



Expliquez à la mère /l'accompagnant que même si l'enfant s'est amélioré, l'infection peut être encore présente dans son corps. TOUS les comprimés devraient être donnés pour éliminer la bactérie /l'infection.



1 Laver les mains, et prendre:

■ 1 comprimé pour l'enfant de 2 mois à 12 mois.

■ 2 comprimés pour l'enfant de 12 mois à 5 ans.

2 Mettre dans une petite tasse propre.

3 Ajouter de l'eau à boire ou le lait maternel jusqu'à couvrir le(s) comprimé(s) complètement.

4 Mélanger bien le(s) comprimé(s) dans l'eau ou le lait maternel.

5 S'assurer que l'enfant a bu tout le médicament.



IMPORTANT

- Vérifier la date de péremption avant de donner le médicament à la mère /l'accompagnant.
- Informer la mère /l'accompagnant qu'il faut donner immédiatement le mélange à l'enfant. Ne pas le garder pour le donner plus tard.
- Donner à l'enfant ce qui reste de médicament dans la tasse.
- Informer la mère /l'accompagnant de garder l'amoxicilline hors de la portée des enfants et dans un endroit propre et sec.
- Dire à la mère /l'accompagnant de ne pas partager les médicaments.
- Dire à la mère /l'accompagnant que Amoxicilline ne peut pas traiter une infection virale comme la grippe ou rhume.

SUIVI

Instruire à la mère /l'accompagnant

- A continuer l'allaitement et à donner plus des liquides à l'enfant.
- A revenir immédiatement si l'enfant:
 - Devient plus malade
 - Est incapable de boire où téter
 - Vomit tout ce qu'il consomme
 - Développe la fièvre
 - Continue à avoir une respiration rapide ou difficile ou sifflante

LORS DES VISITES DE SUIVI

- Vérifier la présence des signes de danger
- Evaluer si l'enfant a la toux ou difficulté respiratoire
- Demander à la mère /l'accompagnant
 - Est-ce que l'enfant respire moins vite?
 - Est-ce que l'enfant a moins de fièvre?
 - Est-ce que l'enfant mange mieux?
- Considérez la référence si l'enfant ne s'est pas amélioré



EFFETS SECONDAIRES

- Les effets secondaires, comme avec les autres pénicillines, sont rares et principalement de nature légère et transitoire