



Amoxicilline Suspension orale 250mg/5mL



Traitement de pneumonie des enfants de 2 mois à 5 ans



- Ajouter de l'eau à boire au flacon jusqu'à ce que l'eau atteigne la ligne
- Agiter le flacon
- Mesurez la dose à l'aide de la seringue orale ou une cuillère à café :
■ 5mL pour 2mois à 12 mois
- S'assurer que l'enfant boit tout le médicament



- Ajouter de l'eau à boire au flacon jusqu'à ce que l'eau atteigne la ligne
- Agiter le flacon
- Mesurez la dose à l'aide de la petite tasse.
■ 10mL pour 12 mois à 3 ans
■ 15mL pour 3 ans à 5 ans
- S'assurer que l'enfant boit tout le médicament



Expliquer à la mère ou l'accompagnant que même si l'enfant s'est amélioré, l'infection peut être encore présente dans son corp. TOUT le médicament devrait être donné pour éliminer la bactérie

POSOLOGIE

- Démontrer en donnant la première dose. La mère ou l'accompagnant de l'enfant regardera et apprendra.
- Donner ce qui reste de traitement à mère /l'accompagnant pour administrer à la maison.
- Informer la mère / l'accompagnant qu'il faut donner le médicament 2 fois par jour pendant 5 jours, même si l'enfant se sent mieux.



IMPORTANT

- Vérifier la date de péremption avant de donner le médicament à la mère /l'accompagnant.
- Donner à l'enfant ce qui reste de médicament dans la tasse.
- Informer la mère /l'accompagnant de garder l'amoxicilline hors de la portée des enfants et dans un endroit propre et sec.
- Dire à la mère /l'accompagnant de ne pas partager les médicaments.
- Dire à la mère /l'accompagnant que Amoxicilline ne peut pas traiter une infection virale comme la grippe ou rhume.

SUIVI

Instruire à la mère /l'accompagnant

- A continuer l'allaitement et à donner plus des liquides à l'enfant.
- A revenir immédiatement si l'enfant:
 - Devient plus malade
 - Est incapable de boire ou téter
 - Vomit tout ce qu'il consomme
 - Développe la fièvre
 - Continue à avoir une respiration rapide ou difficile ou siffante

LORS DES VISITES DE SUIVI

- Vérifier la présence des signes de danger
- Evaluer si l'enfant a la toux ou difficulté respiratoire
- Demander à la mère /l'accompagnant
 - Est-ce que l'enfant respire moins vite?
 - Est-ce que l'enfant a moins de fièvre?
 - Est-ce que l'enfant mange mieux?
- Considérez la référence si l'enfant ne s'est pas amélioré



EFFETS SECONDAIRES

- Les effets secondaires, comme avec les autres pénicillines, sont rares et principalement de nature légère et transitoire