



Amoxicilina suspensión oral 250mg/5mL



Tratamiento de neumonía para niños de 2 meses a 5 años de edad



- Añadir agua potable a la botella hasta la línea.**
- Agitar la botella.**
- Medir la dosis usando la jeringa oral o una cucharadita:**
 - 5mL para niños con 2 meses a menor de 12 meses
- Asegurar que el niño/a tome toda la medicina.**



- Añadir agua potable a la botella hasta la línea.**
- Agitar la botella.**
- Medir la dosis usando la taza:**
 - 10mL para niños con 12 meses a menor de 3 años
 - 15mL para niños con 3 años a menor de 5 años
- Asegurar que el niño/a tome toda la medicina.**



Explicar a la madre o cuidador: Aún si el niño/a se siente mejor, puede que la infección siga en su cuerpo. Se debe usar TODA la medicina para matar a las bacterias.

RÉGIMEN DE DOSIFICACIÓN

- Dar la primera dosis para demostrar a la madre o cuidador el método correcto a administrar la medicina
- Entregar el resto de la medicina a la madre o cuidador para darle al niño/a en casa.
- Indicar a la madre o cuidador que debe dar la medicina al niño/a 2 veces al día durante los 5 días enteros, aun s el niño/a se siente mejor.



IMPORTANTE

- Verificar la fecha de expiración antes de entregar la medicina a la madre o cuidador
- Si quedó medicina en la taza/jeringa dárselo al niño/a
- Indicar a la madre o cuidador que debe guardar la amoxicilina fuera del alcance de los niños, en un lugar limpio y seco.
- Indicar a la madre o cuidador que no se debe compartir la medicina.
- Indicar a la madre o cuidador que no se puede utilizar la amoxicilina para tratar infecciones virales como el resfrío común o la gripe.

INDICACIONES PARA VISITA DE SEGUIMIENTO

- Indicar a la madre o cuidador
- A seguir dando pecho y más líquidos al niño/a.
 - A volver de inmediato si el niño/a :
 - empeora
 - no puede beber ni lactar
 - está vomitando todo
 - presenta fiebre
 - sigue respirando con rapidez o con dificultad, o tiene sibilancias

DURANTE LA VISITA DE SEGUIMIENTO

- Verificar que no hayan signos de riesgo
- Verificar que el niño/a no tenga tos o dificultad para respirar
- Preguntar a la madre o cuidador:
 - ¿El niño/a está respirando más lento?
 - ¿Ha bajado la fiebre del niño/a?
 - ¿El niño está comiendo mejor?
- Considerar referir al niño a otro establecimiento de salud si no hay mejora.



EFFECTOS SECUNDARIOS

- Como es el caso con otros tipos de penicilina, no suele haber efectos secundarios, y si los hay suelen ser leves y no duraderos.